

КЛІЩІ



Інфекції влітку



Кліщі є самими небезпечними членистоногими тому, що можуть переносити при укусі вірус хвороби Лайма.

Основною клінічною ознакою хвороби Лайма є мігруюча еритема (почервоніння з блідим центром), яка розвивається в місці укусу кліща.

Часто разом з еритемою у людини з'являються такі симптоми: гарячка, головний біль, затверділість м'язів шиї, ломота всього тіла й млявість.

Тривалість інкубаційного періоду варіює у широких межах від 1 до 53 днів, найчастіше – 12 днів.

- Якщо на собі виявили кліща, негайно зверніться до найближчого травмпункту лікувального закладу
- При відсутності такої можливості, необхідно якомога швидше видалити кліща самостійно

Пам'ятайте! Не треба кліща заливати різними речовинами, давити його. Відірваний хоботок кліща може викликати нагноєння рани.

- Після видалення місце укусу обробіть антисептиком
- Уважно слідкуйте за місцем укусу та при будь – яких проявах запалення, зверніться до лікаря

Видаленого кліща бажано дослідити в лабораторії

КОМАРИ



Укуси комарів можуть викликати не тільки свербіж, але й захворювання на дирофіляріоз. Це паразитування нематоди під шкірою, у слизовій оболонці, кон'юктиві органів зору, молочних залозах та ін.



Від укусу до виявлення захворювання проходить від декількох місяців до року.

Ознаки захворювання: набряки в місці укусу, свербіж, головний біль, відчуття переміщення гельмінта під шкірою.

Лікування : тільки хірургічне видалення паразита.



Заходи профілактики:

- закритий, світлий одяг
- репелентні спреї, лосьйони, антикомарині браслети
- в приміщенні – антимооситні сітки та електрофумігатор



ОСИ, БДЖОЛИ ТА ДЖМЕЛІ


При множинних укусах отрута цих комах небезпечна, особливо для людей, які мають алергічні захворювання. Саме небезпечне місце – слизова ротова порожнина та язик, в такому випадку у людини може наступити задуха.



При укусах:

- спочатку треба видалити жало, яке залишилося
- промити місце укусу водою з милом
- обробити ранку спиртом, оцтом
- прикласти холод, щоб зняти набряк
- пити багато води або чаю
- не розчісувати місце укусу!

**Якщо виникла алергічна реакція,
терміново прийміть антигістамінні препарати**



Для запобігання укусу комах, перш за все, уникати місць їх масового скупчення на вулиці, обережно вживати різні солодкі фрукти та не подразнювати комах різкими рухами, не користуватися парфумами з різким запахом, бути пильними біля рослин, які квітнуть, відчиняти вікна тільки після заходу сонця, коли всі оси та бджоли повернулися до своїх гнізд, або мати на вікнах протимоскітні сітки.

МУРАХИ



Що робити при укусі мурахи:

- місце укусу промити мильною водою
- покласти лід на 10-15хвилин
- обробити місце укусу антисептиком

При сильному свербінні та почервонінні використовуйте протиалергічні засоби у вигляді мазей.

При тривалому опуханні, свербіжу або висипки, підвищенні температури тіла – зверніться до лікаря!

Укуси рудих мурах викликають найбільший дискомфорт.

Мурашина кислота не є отрутною для людини.



➤ При укусі мураха виділяє токсин, який викликає алергічну реакцію.

➤ Постраждалі місця візуально схожі на укуси бліх, але жало мурашки спричиняє миттєвий гострий біль.

БЛОХИ



Блохи можуть переносити збудників небезпечних інфекційних захворювань: лістеріозу, туляремії, дирофіляріозу та інші.

Укуси від бліх знаходяться в області ступнів та гомілок, з'являються групами по 3-4 і нагадують маленькі червоні пухирці.

При укусах бліх:

- місце укусу промити водою з милом
- не розчісувати місце укусу
- змастити місця укусу антигістаміновими мазями



Для боротьби з блохами :

- не контактувати з переносниками бліх
- вчасно проводити обробки від бліх домашніх тварин
- при появі бліх в приміщенні - провести санітарну обробку: пропилососити всі килими, підлогу та м'які меблі, випрати постільну білизну у воді при $T 60^{\circ} C$
- провести аерозольну обробку внутрішніх та зовнішніх поверхонь на висоті до 1,2м

МОШКИ



Укуси мошок у людини спричиняють сильне печіння саме в момент укусу, потім переходить у біль, свербіж та сильний набряк. Пухирі можуть залишатися протягом тривалого часу.

Комахи рояться в парках і біля водойм. Алергія до комах часто пов'язана з токсичною дією слини цієї мошки. Це може бути у людей, коли є різні порушення обміну речовин або коли є алергічна реакція безпосередньо до комах.

Профілактика укусів:

Під час прогулянки біля водойм або річок одягати одяг з довгими рукавами та використовувати репеленти.

- При укусах мошок слід прийняти антигістамінні препарати
- Від наслідків укусів допомагають протиалергійні мазі
- якщо алергічна реакція не зменшується або є нагноєння – потрібна консультація лікаря



ПАВУКИ

АГРІЮПА



- Укус павука агріюпи не смертельний, але дуже болючий.

ТАРАНТУЛ



- Пік активності павука тарантула : травень – червень.
- На місці укусу з'являється гострий, пекучий біль, може бути кровотеча та невелика інтоксикація.

КАРАКУРТ



- Отрута каракурта (“чорної удови”) є найбільш загрозна для людини. Найбільш активні павуки у липні та серпні.
- Сам укус безболісний, залишаються дві маленькі червоні плями, оточені невеликим почервонінням, незначно набряклі та онімінні. Вже через півгодини (у деяких випадках до 6 годин) після укусу з'являється різкий біль, що поширюється на область живота, попереку, грудну клітину, підвищується температура тіла до критичних цифр.

Місце укусу промити водою з милом, прикласти лід, прийняти антигістамінні препарати та звернутися до лікаря

КЛОПИ

Клоп постільний, або постільна блошиця, кровосисна комаха. Укуси клопів небезпечні через сильну алергічну реакцію.

укуси розташовані групою або лінійно через декілька сантиметрів один від одного.

Симптоматика укусів:

- ❖ біль
- ❖ свербіння
- ❖ дерматит
- ❖ набряки та пухирі

При укусі :

- місце укусу не розчісувати
- ретельно промити місце водою з милом
- використовуйте місцево протизапальні та антигістамінні засоби



У будинках клопи ховаються під шпалерами, в щілинах підлоги, складках матраців, у меблях та інших місцях.

Ці комахи ведуть нічний спосіб життя. Часті укуси клопів порушують нормальний сон людини. Постільний клоп виділяє неприємний запах.

Мікробіологічна лабораторія

ВСП “Криворізький районний відділ ДУ

“Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” проводить ентомологічні лабораторні дослідження:

- комах, що мають епідемічне значення (комарі, кліщі, компоненти гнусу);
- дослідження проб побутового порошку на наявність алергенних та інших кліщів;
- виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи),

за адресою: вул. Міжпланетна, 2

тел. 068 140 74 63